


IŠMATŲ ĖMINIAI

TYRIMAS DĖL SLAPTO KRAUJAVIMO IŠ ŽARNYNO (būtinai pasiruošimas)

Tyrimui iš gydytojo gautą OC-Auto mėginio surinkėją prieš naudojimą laikykite kambario temperatūroje

1. Ant mėginio surinkėjo **užrašykite** identifikacinius duomenis.
2. Į tualetą įklokite švaraus popierio sluoksnį (vengti kontakto su vandeniu)
3. Pasituštinę, laikydami mėginio surinkėją vertikaliai, atidarykite užsukamą dangtelį.
4. Išimkite spiralinę lazdelę. **Įbeskite** spiralinę lazdelę į **3–4 skirtingas** išmatų mėginio **vietas**.
5. **Įdėkite** spiralinę lazdelę kartu su išmatų mėginiu į **mėginio surinkėją** ir uždarykite.
6. **Laikykite** mėginio surinkėją **per naktį** vėsioje ir tamsioje vietoje ir pristatykite į laboratoriją.*

*Buferiniame tirpale esančius išmatų mėginius būtina pristatyti į laboratoriją per 5 dienas



IŠMATŲ TYRIMAMS NETINKA:

- × Išmatų ėminiai surinkti po:
 - klizmos procedūrų
 - žvakučių naudojimo
 - kitų vaistų, turinčių įtakos išmatų formavimuisi, vartojimo
- × Ėminiai, surinkti ne į tam skirtą talpą

KAIP PASIRUOŠTI?

- Ėminiai neturi būti surenkami menstruacijų metu ar kraujuojant iš hemoraginių mazgų.
- 3-4 dienas prieš ėminio surinkimą nevalgyti termiškai neapdorotos mėsos, žuvies.
- Nevalgyti vaisių ir daržovių, kurių sudėtyje yra peroksidazės (krienai, žiediniai kopūstai, šparaginės pupelės, obuoliai, apelsinai).
- Iki tyrimo kelias dienas nevertoti skrandį dirginančių ir steroidinių priešuždegiminių vaistų, geležies preparatų.
- Iki tyrimo kelias dienas susilaikyti nuo alkoholio vartojimo.

IŠMATŲ ĖMINIAI

KOPROLOGINIS, KIRMINŲ KIAUŠINĖLIŲ, PIRMUONIŲ TYRIMAS

(Specialus pasiruošimas nebūtinus)

- Ėminį paimti iš keletos (3–4) vietų, atkreipti dėmesį į gleives, kraujo gumuliukus, juos būtinai paimti tyrimui;
- Išmatas (5–15 g) rinkti į švarų, sausą plastikinį indelį, kurį galite įsigyti vaistinėje;
- Į laboratoriją kartu su išmatomis pristatyti ir išėjusius ar išsiskyrusius helmintus;
- Ant indelio užrašyti savo vardą ir pavardę, gimimo datą.
- Ėminį pristatyti per 1–2 val., laikant jį 18–25 °C. Jeigu laikomas šaldytuve (2–8°C) – 24 val.
- Išmatų mėginį pirmuonių nustatymui pristatyti kaip imanoma greičiau.



NUOGRANDŲ TYRIMAS SPALINĖMS NUSTATYTI

- Spalinių tyrimui išmatos surenkamos į specialų indelį, kurį galima pasiimti laboratorijoje.
- Indelis su mėginiu turi būti pristatomas į laboratoriją tą pačią dieną, rekomenduojama kuo skubiau, laikant jį (+15...+25) °C temperatūroje.



Po nakties miego
nesituštinama ir
nesiprausiamo, tiriamaoji
medžiaga imama 5–7val.
ryte.